




Esquema ACIP 2013 para adultos según indicaciones médicas y otras indicaciones

VACUNA ▼	INDICACION ►	Embarazo	Condiciones inmunodepresoras (excluyendo virus de inmunodeficiencia humana VIH ^{4,6,7,10,15})	Infección por VIH Linfocito t CD4+ recuento ^{4,6,7,10,14,15}		Hombres que tienen sexo con hombres (MSM)	Enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar, alcoholismo crónico	Asplenia (incluyendo esplenectomía electiva y deficiencias persistentes del componente del complemento ^{10,14})	Enfermedad hepática crónica	Insuficiencia renal, enfermedad renal terminal, recibe hemodiálisis	Diabetes	Personal de la salud	
				< 200 cel/μL	≥ 200 cel/μL								
Influenza ^{2,*}				1 dosis anualmente		1 dosis IV o LAIV anualmente		1 dosis anualmente				1 dosis IV o LAIV anualmente	
Tetano, difteria, tosferina (Td/Tdap) ^{3,*}		1 dosis Tdap cada embarazo		Sustituir una dosis de Td por refuerzo con Tdap; luego refuerzo con Td cada 10 años									
Varicela ^{4,*}			Contraindicado		2 dosis								
Virus del Papiloma Humano (HPV) Mujer ^{5,*}				3 dosis hasta los 26 años			3 dosis hasta los 26 años						
Virus del Papiloma Humano (HPV) Hombre ^{5,*}				3 dosis hasta los 26 años			3 dosis hasta los 21 años						
Herpes Zoster ⁶			Contraindicado		1 dosis								
Sarampión, paroditis, rubeola (MMR) ^{7,*}			Contraindicado		1 o 2 dosis								
Antineumocócica polisacarida (PPSV23) ^{8,9}				1 o 2 dosis									
Antineumocócica conjugada 13-valente (PCV13) ¹⁰								1 dosis					
Antimeningocócica ^{11,*}								1 o más dosis					
Hepatitis A ^{12,*}						2 dosis							
Hepatitis B ^{13,*}						3 dosis							

*Cubierta por el Programa de Compensación de Lesión por Vacuna.

 Para todos los individuos en esta categoría que cumplen con los requisitos de edad y carecen de documentación de vacunación o no tienen evidencia de infección previa; la vacuna de herpes zoster se recomienda sin tener en cuenta un episodio previo de herpes zoster.

 Recomendada si algún otro factor de riesgo está presente (por ejemplo, en base a las indicaciones médicas, ocupacionales, estilo de vida, u otras indicaciones)

 Ninguna recomendación.

Estos esquemas indican los grupos de edad recomendados e indicaciones médicas para las cuales la administración de vacunas licenciadas actualmente está indicada comúnmente para adultos de 19 años de edad y mayores, a partir de enero 1 de 2013. Para todas las vacunas que se recomiendan en el Esquema de Inmunización de Adultos: no se requiere la reiniciación de la serie de la vacuna, independiente del tiempo que haya transcurrido entre las dosis. Las vacunas de combinación licenciadas se pueden utilizar siempre que cualquiera de los componentes de la combinación está indicado y cuando los otros componentes de la vacuna no están contraindicados. Para las recomendaciones detalladas en todas las vacunas, incluyendo aquellas utilizadas principalmente para viajeros o que se emiten durante el año, consulte los insertos del empaque de los fabricantes y las declaraciones completas del Comité Asesor sobre Prácticas de inmunización (www.cdc.gov/vaccines/pubs/acip-list.htm). El uso de nombres registrados y fuentes comerciales es para fines de identificación únicamente y no implica el aval del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Esquema ACIP 2013 para adultos según indicaciones médicas y otras indicaciones

