

**NUEVA
INDICACIÓN**
a partir de los
9 meses de edad



Menactra[®]

Vacuna conjugada de polisacáridos bacterianos de meningococo Grupos A, C, Y y W-135 con toxoide diftérico.

La Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI) es rápidamente progresiva y potencialmente fatal, puede tomar la vida de un niño en menos de 24 horas.


Ahora usted puede proteger a sus pacientes a partir de los 9 meses de edad

	Canadá (2006)	Estados Unidos (1998-2007)	Europa (2007)	Brasil (1996-2001)
Infantes (<i><1 año</i>)	7,83	5,38	17,0	14,7
Adolescentes (<i>rango de edad</i>)	1,43 (15-19 años)	0,78 (15-24 años)	2,29 (15-19 años)	1,9 (15-19 años)
Proporción	5,5x mas en infantes	6,9x mas en infantes	7,4x mas infantes	7,7x mas en infantes

Alrededor del mundo la incidencia de la enfermedad meningocócica es mayor en lactantes que en adolescentes

Referencia 1-4

Aislamientos en Colombia - 1994 a 2005




En Colombia la mayor incidencia de enfermedad, se encuentra en niños.

Referencia 5

Porcentaje de seroprotección para el esquema a partir de los 9 meses por serogrupo:


Menactra® genera altas tasas de seroprotección, para los 4 serogrupos incluidos en el esquema de dos dosis para el rango de 9-12 meses:

A: 88.9%, C:100%, Y:94.6% , W-135:91.7%




Referencia 6

Menactra® ha demostrado que produce niveles de protección administrada sola o concomitante a partir de los 9 meses de edad



Referencia 7

Menactra® no interfiere con la respuesta inducida por PVC o MMR



Referencia 8

