

# Tonimer®

BALSÁMICO



**Nuevo**

Toda la fuerza del MAR  
en un respiro Vital

## Novedoso Gel Hipertónico con un rápido y potente efecto descongestionante Nasal.

- Agua de Mar Hipertónica rica en oligoelementos marinos, con acción antiinflamatoria y descongestionante de la mucosa nasal.
- Eucalipto con propiedades Calmantes y Refrescantes.
- Ácido Hialurónico con actividad regeneradora e hidratantes.
- Aceite Esencial de Niaouli con propiedades antisépticas.
- Formulación en Gel que evita la deglución del producto.

### Propiedades del Tonimer Balsámico

- Rápida acción descongestionante por efecto osmótico.
- Rápida acción antiinflamatoria de la mucosa nasal.
- Rápido Alivio de los síntomas.
- Sin riesgo de efecto rebote.
- Seguridad en el tratamiento.
- Una agradable sensación de Frescura.

Dos Presentaciones:



**Tonimer Balsámico Soft 15ml**  
**Tonimer Balsámico Strong 15ml**

**Aplicador anatómico con presión regulada, rocía el gel de una forma constante y segura lo que garantiza una acción local sobre las fosas nasales**

**Tonimer**  
BALSÁMICO



Toda la fuerza del MAR  
en un respiro Vital

**Nuevo**



## Sin Efecto Sobre:

### Sistema Cardiovascular.

No Aumenta la presión arterial.  
No Aumenta la frecuencia cardiaca.  
No Aumenta el gasto cardiaco

### Ojos.

No Aumenta la presión intraocular  
que puede causar glaucoma en  
personas con predisposición.

### Sistema Nervioso Central.

No causa hipe-reactividad que puede  
ocasionar cefaleas, insomnio  
o ansiedad

Sin desbalance de sistema urinario  
y del sistema endocrino

**La Mejor Alternativa frente a los Vasoconstrictores**

## Indicaciones

Resfriado común de origen Viral.  
Rinitis, Sinusitis y Rinosinusitis Aguda.  
Exacerbación Aguda de Rinitis, Sinusitis y Rinosinusitis crónicas.  
Rinitis del embarazo.

## Dosificación

### **Tonimer Balsámico Soft: (Niños Mayores de 6 años)**

Uno o dos puff cada 6 u 8 horas de 7 a 10 días.

### **Tonimer Balsámico Strong: (Niños Mayores de 12 Años y Adultos)**

Uno o dos Puff cada 6 a 8 Horas de 7 a 10 días.

No usar en pacientes con mucosa nasal altamente sensible que pudieran provocar una epistaxis  
o a personas que sufren de laringoespasma, convulsiones o quienes sean hipersensibles al producto

**COLVENFAR**