

# 2.1

## Vacunación del escolar y adolescente sano: esquema sugerido por la SCP

Vacuna		6 años	9 años	10 años	11 años	12- 15 años	16 años
Influenza (Tetraivalente o trivalente) <sup>c</sup>							
Tdap <sup>d</sup>					X		
VPH <sup>a</sup>			X				
SARS-CoV-2 <sup>b</sup>							
Meningococo Conjugada Tetraivalente (MenACYW) <sup>e</sup>					X		X
Hepatitis A							
Hepatitis B							
Varicela							
SRP							
Meningococo B	Bexsero®			X <sup>f</sup>			
Dengue <sup>g</sup>	TAK-003	X					

Incluida en el PAI.

Vacuna complementaria, no incluida en el PAI.

Si no tiene esquema infantil completo (ver anexo para definir número de dosis).

Cuando se encuentre disponible.

- A partir del 1 de octubre de 2023, se anunció la dosis única de VPH género neutro (niños y niñas).
- La dosificación varía según la vacuna disponible; la edad recomendada de inicio de vacunación es desde los 6 meses con vacunas de ARNm. Se recomiendan refuerzos con vacunas actualizadas según epidemiología.
- Se recomienda vacunación anual durante todo el curso de la vida.
- Niños y niñas.
- Se puede utilizar cualquiera de las tres vacunas. La dosificación varía si ya se había recibido vacuna previamente. Ver anexo.
- Ver anexo para indicación de refuerzos.
- La vacuna es recomendada a partir de los 4 años en un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses.